TRIMEDEA

Sprachen-Übersicht / Language index

Anwendung und Dosierung der Trimedea-Produkte

Klicken Sie auf eine Sprache, um zum Kapitel zu springen. / Click a language to jump to that chapter.

01. Deutsch - Deutsch (DE)
02. English - English (EN)
03. Italiano - Italiano (IT)
04. Français - Français (FR)
05. Español - Español (ES)
06. Português - Português (PT)
07. Română - Română (RO)
08. Čeština - Čeština (CS)
09. Русский - Русский (RU)
10. العربية - Arabic (AR)
11. עברית - Hebrew (HE)

Kolloidale Metalle · Sango Pur · RMS L+ · Zeolith Pur · Silizium Pur · H2 Pur · Nature Sense · Berry Vital

TRIMEDEA

Zurück zur Übersicht

Für den schnellen Überblick:

Anwendung und Dosierung der Trimedea-Produkte

Kolloidale Metalle

Jeweils morgens und abends vor dem Essen einnehmen. Zwischen der Einnahme unterschiedlicher Kolloide sollten mindestens 15–30 Minuten liegen. Optimal ist es, die Flüssigkeit 1 bis 3 Minuten im Mund zu behalten. Verwenden Sie als Dosierhilfe einen Plastik- oder Holzlöffel (kein Metall!) oder ein Messglas (40 ml).

- Erwachsene: 2 × täglich 1 EL (jeweils ca. 15–30 ml)
- Kinder: 2 × täglich 1–2 TL (jeweils ca. 5–15 ml)
- Kleinkinder: 2 × täglich ½ bis 1 TL (jeweils ca. 3–10 ml)

Äußerlich können die Kolloide in die Armbeuge oder auf das Handgelenk eingerieben werden (z. B. bei Kleinkindern). Ebenso kann man die betroffenen Körperbereiche mit einer Sprühflasche dünn einsprühen. Für innere Anwendungen sprühen Sie die Flüssigkeit mit dem Sprühdosierer in den Mund. So werden die Kolloide direkt über die Mundschleimhaut aufgenommen. Für Haustiere geben Sie die Kolloide einfach ins Trinkwasser. Bei Verletzung, Schmerzen oder Hautproblemen sprühen Sie sie direkt auf.

Ausführliche Informationen

Sango Pur

Jeweils morgens und abends vor dem Essen (30–60 min) einnehmen oder alternativ abends vor dem Schlafengehen. Verwenden Sie einen Löffel aus Plastik oder Holz – kein Metall! Sango Pur kann dauerhaft angewendet werden.

- Erwachsene (Gewicht: ab 50 kg): Bis zu 3 × täglich 1 gestrichenen TL à 3 g
- Kinder (Gewicht 10–50 kg): Bis zu 2 × täglich ½ gestrichenen TL à 1,5 g
- Kleinkinder (Gewicht: 2–10 kg): Bis zu 2 × täglich ½ gestrichenen Espresso-Löffel à 0,5 g

Ausführliche Informationen

RMS L+

Bei akuten Symptomen und Beschwerden 3–4 mal pro Tag die errechnete Dosis einnehmen. Zur Darmsanierung 1–2 mal täglich über mindestens 4–8 Wochen einnehmen. Dosierung: 1 Tropfen pro 3 kg Körpergewicht in 100–200 ml Wasser oder Tee verdünnt schluckweise einnehmen. Achtung: Tropfen nicht unverdünnt einnehmen!

- Bis 15 kg = 5 Tropfen
- Bis 30 kg = 10 Tropfen
- 50–60 kg = 20 Tropfen
- 80–90 kg = 30 Tropfen

Ausführliche Informationen

Zeolith Pur

Jeweils morgens und abends vor dem Essen (30–60 min) einnehmen oder alternativ abends vor dem Schlafengehen. Verwenden Sie einen Löffel aus Plastik oder Holz – kein Metall! Zeolith Pur kann dauerhaft angewendet werden.

- Erwachsene (Gewicht: ab 50 kg): Bis zu 3 × täglich 1 gestrichenen TL à 3 g
- Kinder (Gewicht 10–50 kg): Bis zu 2 × täglich ½ gestrichenen TL à 1,5 g
- Kleinkinder (Gewicht: 2–10 kg): Bis zu 2 × täglich ½ gestrichenen Espresso-Löffel à 0,5 g

Ausführliche Informationen

Silizium Pur

Jeweils morgens und abends vor dem Essen (30–60 min) einnehmen oder alternativ abends vor dem Schlafengehen. Silizium Pur kann dauerhaft angewendet werden.

• Erwachsene (Gewicht: ab 50 kg): Bis zu 3 × täglich 1 gestrichenen Messlöffel (groß) à 100 mg
• Kinder (Gewicht 10–50 kg): Bis zu 2 × täglich 2 gestrichene Messlöffel (klein) à 50 mg
• Kleinkinder (Gewicht: 2–10 kg): Bis zu 2 × täglich ½ gestrichenen Messlöffel (klein) à 15 mg

Ausführliche Informationen

H2 Pur

Die Einnahme ist zu jeder Zeit im Laufe des Tages möglich, z. B. unmittelbar bevor eine erhöhte Leistungsfähigkeit oder Konzentration benötigt wird, zu Beginn sich entwickelnder Kopfschmerzen oder anderer Beschwerden und Schmerzzuständen.

• Erwachsene (Gewicht: ab 50 kg): Bis zu 2 × täglich 1 Tablette in Wasser/Flüssigkeit auflösen und direkt trinken
• Kinder (Gewicht 10–50 kg): Bis zu 1 × täglich 1 Tablette in Wasser/Flüssigkeit auflösen und direkt trinken
• Kleinkinder (Gewicht: 2–10 kg): Bis zu 1 × täglich ½ Tablette in Wasser/Flüssigkeit auflösen und direkt trinken

Ausführliche Informationen

Nature Sense Komplexmittel

Jeweils dreimal täglich in den Mundraum sprühen. Empfohlene Tagesdosis nicht überschreiten.

• Erwachsene: 3 × täglich 3–5 Pumpstöße in den Mundraum sprühen
• Kinder: 3 × täglich 1–3 Pumpstöße in den Mundraum sprühen

Ausführliche Informationen

Berry Vital

Ein Teelöffel pro Tag (7 ml) genügt, um den Körper mit wertvollen und bioverfügbaren Inhaltsstoffen zu versorgen. Dafür Berry Vital auf einen Teelöffel (7 ml) gießen, den Löffel in ein Glas stilles Wasser geben, umrühren und trinken.

Ausführliche Informationen

Allgemeine Empfehlungen

Bitte trinken Sie ausreichend gutes und reines Trinkwasser, damit die gebundenen Schadstoffe aus dem Körper transportiert werden können. Gute, im Handel erhältliche Trinkwasser sind z. B. die Marken Lauretana, Plose und Black Forest. Auf Dauer preiswerter und mit Wasseraktivierung & Energetisierung ist eine Osmose-Wasserfilteranlage wie die AQUNA Osmose Light.

Ausführliche Informationen

TRIMEDEA

Back to overview

At a glance: How to use Trimedea products:

Application and dosage of all Trimedea products

Colloidal Metals

Take in the morning and evening before meals. Leave at least 15–30 minutes between different colloids. It is best to keep the liquid in the mouth for 1 to 3 minutes. Use a plastic or wooden spoon (no metal!) or a measuring glass (40 ml) as a dosing aid.

- Adults: 2 × daily 1 tablespoon (approx. 15–30 ml each)
- Children: 2 × daily 1–2 teaspoons (approx. 5–15 ml each)
- Infants: 2 × daily ½ to 1 teaspoon (approx. 3–10 ml each)

Colloids can be rubbed externally into the crook of the arm or onto the wrist (e.g. for small children). Affected areas can also be sprayed thinly with a spray bottle. For internal use, spray into the mouth with the spray dispenser so the colloids are absorbed through the oral mucosa. For pets, add colloids to drinking water. For injuries, pain or skin problems, spray directly onto the affected area.

Detailed Information

Sango Pur

Take in the morning and evening before meals (30–60 min) or in the evening before going to bed. Use a plastic or wooden spoon – no metal! Sango Pur can be used continuously.

- Adults (from 50 kg): Up to 3 × daily 1 level teaspoon of 3 g
- Children (10–50 kg): Up to 2 × daily ½ level teaspoon of 1.5 g
- Infants (2–10 kg): Up to 2 × daily ½ level espresso spoon of 0.5 g

Detailed Information

RMS L+ (lactic acid drops)

For acute symptoms, take the calculated dose 3–4 times a day. For intestinal support, take 1–2 times a day for at least 4–8 weeks. Dosage: 1 drop per 3 kg body weight, diluted in 100–200 ml water or tea, taken in sips. Caution: Do not take drops undiluted!

- Up to 15 kg = 5 drops
- Up to 30 kg = 10 drops
- 50–60 kg = 20 drops
- 80–90 kg = 30 drops

Detailed Information

Zeolith Pur

Take in the morning and evening before meals (30–60 min) or in the evening before going to bed. Use a plastic or wooden spoon – no metal! Zeolith Pur can be used continuously.

- Adults (from 50 kg): Up to 3 × daily 1 level teaspoon of 3 g
- Children (10–50 kg): Up to 2 × daily ½ level teaspoon of 1.5 g
- Infants (2–10 kg): Up to 2 × daily ½ level espresso spoon of 0.5 g

Detailed Information

Silizium Pur

Take in the morning and evening before meals (30–60 min) or in the evening before going to bed. Silizium Pur can be used continuously.

• Adults (from 50 kg): Up to 3 × daily 1 level measuring spoon (large) of 100 mg
• Children (10–50 kg): Up to 2 × daily 2 level measuring spoons (small) of 50 mg each
• Infants (2–10 kg): Up to 2 × daily ½ level measuring spoon (small) of 15 mg

Detailed Information

H2 Pur – molecular hydrogen

May be taken at any time of day, e.g. just before higher performance or concentration is needed, or at the onset of headaches or other discomfort and pain.

• Adults (from 50 kg): Up to 2 × daily dissolve 1 tablet in water/liquid and drink immediately
• Children (10–50 kg): Up to 1 × daily dissolve 1 tablet in water/liquid and drink immediately
• Infants (2–10 kg): Up to 1 × daily dissolve ½ tablet in water/liquid and drink immediately

Detailed Information

Nature Sense complex

Spray into the mouth three times a day. Do not exceed the recommended daily dose.

• Adults: 3 × daily spray 3–5 pumps into the mouth
• Children: 3 × daily spray 1–3 pumps into the mouth

Detailed Information

Berry Vital

One teaspoon per day (7 ml) is sufficient to supply the body with valuable, bioavailable ingredients. Pour Berry Vital onto a teaspoon (7 ml), place the spoon in a glass of still water, stir and drink.

Detailed Information

General recommendations

Please drink enough good, pure water so that bound pollutants can be transported out of the body. Examples of good commercial drinking waters include Lauretana, Plose and Black Forest. In the long term, an osmosis filter such as AQUNA Osmose Light is more economical and also activates and energises the water.

Detailed Information

TRIMEDEA

Torna all'indice

Panoramica rapida:

Uso e dosaggio dei prodotti Trimedea

Metalli colloidali

Assumere al mattino e alla sera prima dei pasti. Tra colloidi diversi devono trascorrere almeno 15–30 minuti. È ottimale tenere il liquido in bocca per 1–3 minuti. Usare un cucchiaio di plastica o legno (non metallo!) oppure un bicchiere dosatore (40 ml).

• Adulti: 2 × al giorno 1 cucchiaio da tavola (circa 15–30 ml ciascuno)
• Bambini: 2 × al giorno 1–2 cucchiaini (circa 5–15 ml ciascuno)
• Bambini piccoli: 2 × al giorno da ½ a 1 cucchiaino (circa 3–10 ml ciascuno)

Uso esterno: strofinare i colloidi nella piega del gomito o sul polso (es. nei bambini piccoli). Si possono anche nebulizzare le zone interessate. Per uso interno, spruzzare in bocca con il dosatore: assorbimento attraverso la mucosa orale. Per gli animali domestici, aggiungere all'acqua da bere. In caso di lesioni, dolori o problemi cutanei, spruzzare direttamente.

Informazioni dettagliate

Sango Pur

Assumere al mattino e alla sera prima dei pasti (30–60 min) oppure la sera prima di dormire. Usare un cucchiaio di plastica o legno – non metallo! Sango Pur può essere usato a lungo termine.

• Adulti (da 50 kg): Fino a 3 × al giorno 1 cucchiaino raso da 3 g
• Bambini (10–50 kg): Fino a 2 × al giorno ½ cucchiaino raso da 1,5 g
• Bambini piccoli (2–10 kg): Fino a 2 × al giorno ½ cucchiaino espresso raso da 0,5 g

Informazioni dettagliate

RMS L+ (gocce di acido lattico)

In caso di sintomi acuti, assumere la dose calcolata 3–4 volte al giorno. Per la rieducazione intestinale, 1–2 volte al giorno per almeno 4–8 settimane. Dosaggio: 1 goccia ogni 3 kg di peso corporeo, diluita in 100–200 ml di acqua o tè, da bere a sorsi. Attenzione: non assumere le gocce non diluite!

• Fino a 15 kg = 5 gocce
• Fino a 30 kg = 10 gocce
• 50–60 kg = 20 gocce
• 80–90 kg = 30 gocce

Informazioni dettagliate

Zeolith Pur

Assumere al mattino e alla sera prima dei pasti (30–60 min) oppure la sera prima di dormire. Usare un cucchiaio di plastica o legno – non metallo! Zeolith Pur può essere usato a lungo termine.

• Adulti (da 50 kg): Fino a 3 × al giorno 1 cucchiaino raso da 3 g
• Bambini (10–50 kg): Fino a 2 × al giorno ½ cucchiaino raso da 1,5 g
• Bambini piccoli (2–10 kg): Fino a 2 × al giorno ½ cucchiaino espresso raso da 0,5 g

Informazioni dettagliate

Silizium Pur

Assumere al mattino e alla sera prima dei pasti (30–60 min) oppure la sera prima di dormire. Silizium Pur può essere usato a lungo termine.

• Adulti (da 50 kg): Fino a 3 × al giorno 1 misurino raso (grande) da 100 mg
• Bambini (10–50 kg): Fino a 2 × al giorno 2 misurini rasi (piccoli) da 50 mg ciascuno
• Bambini piccoli (2–10 kg): Fino a 2 × al giorno ½ misurino raso (piccolo) da 15 mg

Informazioni dettagliate

H2 Pur – idrogeno molecolare

Può essere assunto in qualsiasi momento della giornata, ad es. subito prima di uno sforzo o di una maggiore concentrazione, o all'inizio di mal di testa o altri disturbi e stati dolorosi.

• Adulti (da 50 kg): Fino a 2 × al giorno sciogliere 1 compressa in acqua/liquido e bere subito
• Bambini (10–50 kg): Fino a 1 × al giorno sciogliere 1 compressa in acqua/liquido e bere subito
• Bambini piccoli (2–10 kg): Fino a 1 × al giorno sciogliere ½ compressa in acqua/liquido e bere subito

Informazioni dettagliate

Nature Sense (complesso)

Spruzzare nella bocca tre volte al giorno. Non superare la dose giornaliera raccomandata.

• Adulti: 3 × al giorno 3–5 erogazioni nella bocca
• Bambini: 3 × al giorno 1–3 erogazioni nella bocca

Informazioni dettagliate

Berry Vital

Un cucchiaino al giorno (7 ml) è sufficiente per fornire al corpo ingredienti preziosi e biodisponibili. Versare Berry Vital su un cucchiaino (7 ml), mettere il cucchiaio in un bicchiere di acqua naturale, mescolare e bere.

Informazioni dettagliate

Raccomandazioni generali

Bevete acqua potabile buona e pura a sufficienza, così che le sostanze indesiderate legate possano essere trasportate fuori dall'organismo. Esempi di acque in commercio: Lauretana, Plose e Black Forest. A lungo termine è più conveniente un impianto a osmosi come AQUNA Osmose Light, che attiva ed energizza anche l'acqua.

Informazioni dettagliate

TRIMEDEA

Retour à l'index

Aperçu rapide :

Utilisation et dosage des produits Trimedea

Métaux colloïdaux

Prendre le matin et le soir avant les repas. Laisser au moins 15–30 minutes entre différents colloïdes. Il est optimal de garder le liquide en bouche 1 à 3 minutes. Utiliser une cuillère en plastique ou en bois (pas de métal !) ou un verre doseur (40 ml).

- Adultes : 2 × par jour 1 c. à soupe (env. 15–30 ml chacune)
- Enfants : 2 × par jour 1–2 c. à café (env. 5–15 ml chacune)
- Petits enfants : 2 × par jour ½ à 1 c. à café (env. 3–10 ml chacune)

Usage externe : frotter dans le pli du coude ou sur le poignet (p. ex. chez les tout-petits). On peut aussi vaporiser légèrement les zones concernées. Pour un usage interne, vaporiser dans la bouche : absorption par la muqueuse buccale. Pour les animaux, ajouter à l'eau de boisson. En cas de blessure, douleur ou problème cutané, vaporiser directement.

Informations détaillées

Sango Pur

Prendre le matin et le soir avant les repas (30–60 min) ou le soir avant le coucher. Cuillère en plastique ou bois – pas de métal ! Sango Pur peut être utilisé durablement.

- Adultes (à partir de 50 kg) : jusqu'à 3 × par jour 1 c. à café rase de 3 g
- Enfants (10–50 kg) : jusqu'à 2 × par jour ½ c. à café rase de 1,5 g
- Petits enfants (2–10 kg) : jusqu'à 2 × par jour ½ c. à café espresso rase de 0,5 g

Informations détaillées

RMS L+ (gouttes d'acide lactique)

En cas de symptômes aigus, prendre la dose calculée 3–4 fois par jour. Pour un soutien intestinal, 1–2 fois par jour pendant au moins 4–8 semaines. Dosage : 1 goutte pour 3 kg de poids corporel, diluée dans 100–200 ml d'eau ou de thé, à boire par petites gorgées. Attention : ne pas prendre les gouttes non diluées !

- Jusqu'à 15 kg = 5 gouttes
- Jusqu'à 30 kg = 10 gouttes
- 50–60 kg = 20 gouttes
- 80–90 kg = 30 gouttes

Informations détaillées

Zeolith Pur

Prendre le matin et le soir avant les repas (30–60 min) ou le soir avant le coucher. Cuillère en plastique ou bois – pas de métal ! Zeolith Pur peut être utilisé durablement.

- Adultes (à partir de 50 kg) : jusqu'à 3 × par jour 1 c. à café rase de 3 g
- Enfants (10–50 kg) : jusqu'à 2 × par jour ½ c. à café rase de 1,5 g
- Petits enfants (2–10 kg) : jusqu'à 2 × par jour ½ c. à café espresso rase de 0,5 g

Informations détaillées

Silizium Pur

Prendre le matin et le soir avant les repas (30–60 min) ou le soir avant le coucher. Silizium Pur peut être utilisé durablement.

• Adultes (à partir de 50 kg) : jusqu'à 3 × par jour 1 doseuse rase (grande) de 100 mg
• Enfants (10–50 kg) : jusqu'à 2 × par jour 2 doseuses rases (petites) de 50 mg chacune
• Petits enfants (2–10 kg) : jusqu'à 2 × par jour ½ doseuse rase (petite) de 15 mg

Informations détaillées

H2 Pur – hydrogène moléculaire

Peut être pris à tout moment de la journée, p. ex. juste avant un besoin de performance ou de concentration accrue, ou au début de maux de tête ou d'autres gênes et douleurs.

• Adultes (à partir de 50 kg) : jusqu'à 2 × par jour dissoudre 1 comprimé dans de l'eau/un liquide et boire aussitôt
• Enfants (10–50 kg) : jusqu'à 1 × par jour dissoudre 1 comprimé dans de l'eau/un liquide et boire aussitôt
• Petits enfants (2–10 kg) : jusqu'à 1 × par jour dissoudre ½ comprimé dans de l'eau/un liquide et boire aussitôt

Informations détaillées

Nature Sense (complexe)

Vaporiser dans la bouche trois fois par jour. Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.

• Adultes : 3 × par jour 3–5 pulvérisations dans la bouche
• Enfants : 3 × par jour 1–3 pulvérisations dans la bouche

Informations détaillées

Berry Vital

Une cuillère à café par jour (7 ml) suffit pour apporter des ingrédients précieux et biodisponibles. Verser Berry Vital sur une cuillère à café (7 ml), plonger la cuillère dans un verre d'eau plate, remuer et boire.

Informations détaillées

Recommandations générales

Buvez suffisamment d'eau potable de bonne qualité et pure, afin que les substances liées puissent être évacuées. Exemples d'eaux commerciales : Lauretana, Plose et Black Forest. À long terme, un filtre à osmose comme AQUNA Osmose Light est plus économique et active aussi l'eau.

Informations détaillées

TRIMEDEA

Volver al índice

Resumen rápido:

Uso y dosificación de los productos Trimedea

Metales coloidales

Tomar por la mañana y por la noche antes de las comidas. Deje al menos 15–30 minutos entre diferentes coloides. Lo ideal es mantener el líquido en la boca de 1 a 3 minutos. Use una cuchara de plástico o madera (¡nada de metal!) o un vaso dosificador (40 ml).

- Adultos: 2 × al día 1 cucharada sopera (aprox. 15–30 ml cada una)
- Niños: 2 × al día 1–2 cucharaditas (aprox. 5–15 ml cada una)
- Niños pequeños: 2 × al día de ½ a 1 cucharadita (aprox. 3–10 ml cada una)

Uso externo: frotar en el pliegue del codo o en la muñeca (p. ej. en niños pequeños). También se pueden pulverizar las zonas afectadas. Para uso interno, pulverizar en la boca con el dosificador: absorción por la mucosa oral. Para mascotas, añadir al agua de beber. En caso de lesiones, dolor o problemas cutáneos, pulverizar directamente.

Información detallada

Sango Pur

Tomar por la mañana y por la noche antes de las comidas (30–60 min) o por la noche antes de dormir. Cuchara de plástico o madera – ¡sin metal! Sango Pur se puede usar de forma continua.

- Adultos (desde 50 kg): Hasta 3 × al día 1 cucharadita rasa de 3 g
- Niños (10–50 kg): Hasta 2 × al día ½ cucharadita rasa de 1,5 g
- Niños pequeños (2–10 kg): Hasta 2 × al día ½ cucharadita de espresso rasa de 0,5 g

Información detallada

RMS L+ (gotas de ácido láctico)

En síntomas agudos, tomar la dosis calculada 3–4 veces al día. Para el apoyo intestinal, 1–2 veces al día durante al menos 4–8 semanas. Dosis: 1 gota por cada 3 kg de peso corporal, diluida en 100–200 ml de agua o té, a sorbos. Atención: ¡no tomar las gotas sin diluir!

- Hasta 15 kg = 5 gotas
- Hasta 30 kg = 10 gotas
- 50–60 kg = 20 gotas
- 80–90 kg = 30 gotas

Información detallada

Zeolith Pur

Tomar por la mañana y por la noche antes de las comidas (30–60 min) o por la noche antes de dormir. Cuchara de plástico o madera – ¡sin metal! Zeolith Pur se puede usar de forma continua.

- Adultos (desde 50 kg): Hasta 3 × al día 1 cucharadita rasa de 3 g
- Niños (10–50 kg): Hasta 2 × al día ½ cucharadita rasa de 1,5 g
- Niños pequeños (2–10 kg): Hasta 2 × al día ½ cucharadita de espresso rasa de 0,5 g

Información detallada

Silizium Pur

Tomar por la mañana y por la noche antes de las comidas (30–60 min) o por la noche antes de dormir. Silizium Pur se puede usar de forma continua.

• Adultos (desde 50 kg): Hasta 3 × al día 1 cucharada medidora rasa (grande) de 100 mg
• Niños (10–50 kg): Hasta 2 × al día 2 cucharadas medidoras rasas (pequeñas) de 50 mg cada una
• Niños pequeños (2–10 kg): Hasta 2 × al día ½ cucharada medidora rasa (pequeña) de 15 mg

Información detallada

H2 Pur – hidrógeno molecular

Se puede tomar en cualquier momento del día, p. ej. justo antes de un mayor rendimiento o concentración, o al inicio de dolores de cabeza u otras molestias y estados de dolor.

• Adultos (desde 50 kg): Hasta 2 × al día disolver 1 comprimido en agua/líquido y beber de inmediato
• Niños (10–50 kg): Hasta 1 × al día disolver 1 comprimido en agua/líquido y beber de inmediato
• Niños pequeños (2–10 kg): Hasta 1 × al día disolver ½ comprimido en agua/líquido y beber de inmediato

Información detallada

Nature Sense (complejo)

Pulverizar en la boca tres veces al día. No superar la dosis diaria recomendada.

• Adultos: 3 × al día 3–5 pulverizaciones en la boca
• Niños: 3 × al día 1–3 pulverizaciones en la boca

Información detallada

Berry Vital

Una cucharadita al día (7 ml) basta para aportar ingredientes valiosos y biodisponibles. Vierta Berry Vital en una cucharadita (7 ml), introduzca la cuchara en un vaso de agua sin gas, remueva y beba.

Información detallada

Recomendaciones generales

Beba suficiente agua potable de buena calidad y pura para que las sustancias ligadas puedan eliminarse del cuerpo. Ejemplos de aguas comerciales: Lauretana, Plose y Black Forest. A largo plazo, un filtro de ósmosis como AQUNA Osmose Light es más económico y también activa el agua.

Información detallada

TRIMEDEA

Voltar ao índice

Visão geral rápida:

Utilização e dosagem dos produtos Trimedea

Metais coloidais

Tomar de manhã e à noite antes das refeições. Deixe pelo menos 15–30 minutos entre coloides diferentes. O ideal é manter o líquido na boca durante 1 a 3 minutos. Use uma colher de plástico ou madeira (sem metal!) ou um copo doseador (40 ml).

- Adultos: 2 × por dia 1 colher de sopa (aprox. 15–30 ml cada)
- Crianças: 2 × por dia 1–2 colheres de chá (aprox. 5–15 ml cada)
- Crianças pequenas: 2 × por dia de ½ a 1 colher de chá (aprox. 3–10 ml cada)

Uso externo: esfregar na dobra do cotovelo ou no pulso (p. ex. em crianças pequenas). Também se pode pulverizar as zonas afetadas. Para uso interno, pulverizar na boca com o doseador: absorção pela mucosa oral. Para animais de estimação, adicionar à água de beber. Em lesões, dor ou problemas de pele, pulverizar diretamente.

Informações detalhadas

Sango Pur

Tomar de manhã e à noite antes das refeições (30–60 min) ou à noite antes de dormir. Colher de plástico ou madeira – sem metal! Sango Pur pode ser usado de forma contínua.

- Adultos (a partir de 50 kg): Até 3 × por dia 1 colher de chá rasa de 3 g
- Crianças (10–50 kg): Até 2 × por dia ½ colher de chá rasa de 1,5 g
- Crianças pequenas (2–10 kg): Até 2 × por dia ½ colher de café espresso rasa de 0,5 g

Informações detalhadas

RMS L+ (gotas de ácido láctico)

Em sintomas agudos, tomar a dose calculada 3–4 vezes por dia. Para apoio intestinal, 1–2 vezes por dia durante pelo menos 4–8 semanas. Dose: 1 gota por cada 3 kg de peso corporal, diluída em 100–200 ml de água ou chá, a beber aos goles. Atenção: não tomar as gotas sem diluir!

- Até 15 kg = 5 gotas
- Até 30 kg = 10 gotas
- 50–60 kg = 20 gotas
- 80–90 kg = 30 gotas

Informações detalhadas

Zeolith Pur

Tomar de manhã e à noite antes das refeições (30–60 min) ou à noite antes de dormir. Colher de plástico ou madeira – sem metal! Zeolith Pur pode ser usado de forma contínua.

- Adultos (a partir de 50 kg): Até 3 × por dia 1 colher de chá rasa de 3 g
- Crianças (10–50 kg): Até 2 × por dia ½ colher de chá rasa de 1,5 g
- Crianças pequenas (2–10 kg): Até 2 × por dia ½ colher de café espresso rasa de 0,5 g

Informações detalhadas

Silizium Pur

Tomar de manhã e à noite antes das refeições (30–60 min) ou à noite antes de dormir. Silizium Pur pode ser usado de forma contínua.

• Adultos (a partir de 50 kg): Até 3 × por dia 1 colher doseadora rasa (grande) de 100 mg
• Crianças (10–50 kg): Até 2 × por dia 2 colheres doseadoras rasas (pequenas) de 50 mg cada
• Crianças pequenas (2–10 kg): Até 2 × por dia ½ colher doseadora rasa (pequena) de 15 mg

Informações detalhadas

H2 Pur – hidrogénio molecular

Pode ser tomado a qualquer hora do dia, p. ex. imediatamente antes de maior desempenho ou concentração, ou no início de dores de cabeça ou outras queixas e estados de dor.

• Adultos (a partir de 50 kg): Até 2 × por dia dissolver 1 comprimido em água/líquido e beber de imediato
• Crianças (10–50 kg): Até 1 × por dia dissolver 1 comprimido em água/líquido e beber de imediato
• Crianças pequenas (2–10 kg): Até 1 × por dia dissolver ½ comprimido em água/líquido e beber de imediato

Informações detalhadas

Nature Sense (complexo)

Pulverizar na boca três vezes por dia. Não exceder a dose diária recomendada.

• Adultos: 3 × por dia 3–5 pulverizações na boca
• Crianças: 3 × por dia 1–3 pulverizações na boca

Informações detalhadas

Berry Vital

Uma colher de chá por dia (7 ml) basta para fornecer ingredientes valiosos e biodisponíveis. Deite Berry Vital numa colher de chá (7 ml), coloque a colher num copo de água sem gás, mexa e beba.

Informações detalhadas

Recomendações gerais

Beba água potável boa e pura em quantidade suficiente para que as substâncias ligadas possam ser eliminadas. Exemplos de águas comerciais: Lauretana, Plose e Black Forest. A longo prazo, um filtro de osmose como AQUNA Osmose Light é mais económico e também ativa a água.

Informações detalhadas

TRIMEDEA

Înapoi la cuprins

Privire de ansamblu rapidă:

Utilizare și dozaj produse Trimedea

Metale coloidale

Se ia dimineața și seara înainte de mese. Între coloizi diferiți trebuie să treacă cel puțin 15–30 de minute. Este optim să țineți lichidul în gură 1–3 minute. Folosiți o lingură de plastic sau lemn (fără metal!) sau un pahar dozator (40 ml).

• Adulți: 2 × pe zi 1 lingură (aprox. 15–30 ml fiecare)
• Copii: 2 × pe zi 1–2 linguriță (aprox. 5–15 ml fiecare)
• Copii mici: 2 × pe zi de la ½ la 1 linguriță (aprox. 3–10 ml fiecare)

Uz extern: frecați colozii pe pliul cotului sau pe încheietură (ex. la copii mici). Zonele afectate pot fi pulverizate ușor. Pentru uz intern, pulverizați în gură cu dozatorul: absorbție prin mucoasa bucală. Pentru animale de companie, adăugați în apa de băut. La leziuni, dureri sau probleme cutanate, pulverizați direct.

Informații detaliate

Sango Pur

Se ia dimineața și seara înainte de mese (30–60 min) sau seara înainte de culcare. Lingură de plastic sau lemn – fără metal! Sango Pur poate fi folosit pe termen lung.

• Adulți (de la 50 kg): Până la 3 × pe zi 1 linguriță rasă de 3 g
• Copii (10–50 kg): Până la 2 × pe zi ½ linguriță rasă de 1,5 g
• Copii mici (2–10 kg): Până la 2 × pe zi ½ linguriță espresso rasă de 0,5 g

Informații detaliate

RMS L+ (picături de acid lactic)

La simptome acute, luați doza calculată de 3–4 ori pe zi. Pentru sprijin intestinal, de 1–2 ori pe zi cel puțin 4–8 săptămâni. Dozaj: 1 picătură la 3 kg greutate corporală, diluată în 100–200 ml apă sau ceai, băută în înghițituri. Atenție: nu luați picăturile nediluate!

• Până la 15 kg = 5 picături
• Până la 30 kg = 10 picături
• 50–60 kg = 20 picături
• 80–90 kg = 30 picături

Informații detaliate

Zeolith Pur

Se ia dimineața și seara înainte de mese (30–60 min) sau seara înainte de culcare. Lingură de plastic sau lemn – fără metal! Zeolith Pur poate fi folosit pe termen lung.

• Adulți (de la 50 kg): Până la 3 × pe zi 1 linguriță rasă de 3 g
• Copii (10–50 kg): Până la 2 × pe zi ½ linguriță rasă de 1,5 g
• Copii mici (2–10 kg): Până la 2 × pe zi ½ linguriță espresso rasă de 0,5 g

Informații detaliate

Silizium Pur

Se ia dimineața și seara înainte de mese (30–60 min) sau seara înainte de culcare. Silizium Pur poate fi folosit pe termen lung.

• Adulți (de la 50 kg): Până la 3 × pe zi 1 linguriță dozatoare rasă (mare) de 100 mg
• Copii (10–50 kg): Până la 2 × pe zi 2 linguriță dozatoare rase (mici) de 50 mg fiecare
• Copii mici (2–10 kg): Până la 2 × pe zi ½ linguriță dozatoare rasă (mică) de 15 mg

Informații detaliate

H2 Pur – hidrogen molecular

Poate fi luat oricând pe parcursul zilei, de ex. imediat înainte de un efort sau o concentrare crescută, sau la debutul durerilor de cap ori al altor disconforturi și stări dureroase.

• Adulți (de la 50 kg): Până la 2 × pe zi dizolvați 1 comprimat în apă/lichid și beți imediat
• Copii (10–50 kg): Până la 1 × pe zi dizolvați 1 comprimat în apă/lichid și beți imediat
• Copii mici (2–10 kg): Până la 1 × pe zi dizolvați ½ comprimat în apă/lichid și beți imediat

Informații detaliate

Nature Sense (complex)

Pulverizați în gură de trei ori pe zi. Nu depășiți doza zilnică recomandată.

• Adulți: 3 × pe zi 3–5 pulverizări în gură
• Copii: 3 × pe zi 1–3 pulverizări în gură

Informații detaliate

Berry Vital

O linguriță pe zi (7 ml) este suficientă pentru a furniza ingrediente valoroase și biodisponibile. Turnați Berry Vital pe o linguriță (7 ml), puneți linguriță într-un pahar cu apă plată, amestecați și beți.

Informații detaliate

Recomandări generale

Beți suficientă apă potabilă bună și pură, astfel încât substanțele legate să poată fi eliminate din organism. Exemple de ape comerciale: Lauretana, Plose și Black Forest. Pe termen lung, un filtru de osmoză precum AQUNA Osmose Light este mai economic și activează apa.

Informații detaliate

TRIMEDEA

Zpět na přehled

Rychlý přehled:

Použití a dávkování produktů Trimedea

Koloidní kovy

Užívat ráno a večer před jídlem. Mezi různými koloidy nechte alespoň 15–30 minut. Optimální je podržet tekutinu v ústech 1–3 minuty. Používejte plastovou nebo dřevěnou lžičku (ne kov!) nebo odměrku (40 ml).

- Dospělí: 2× denně 1 polévková lžíce (cca 15–30 ml)
- Děti: 2× denně 1–2 čajové lžičky (cca 5–15 ml)
- Batolata: 2× denně ½ až 1 čajová lžička (cca 3–10 ml)

Zevně lze koloidy vtírat do loketní jamky nebo na zápěstí (např. u batolat). Postižená místa lze také lehce postříkat. Vnitřně stříkejte do úst dávkovačem – vstřebání přes ústní sliznici. Domácím zvířatům přidejte do pitné vody. Při poranění, bolesti nebo kožních potížích stříkejte přímo.

Podrobné informace

Sango Pur

Užívat ráno a večer před jídlem (30–60 min) nebo večer před spaním. Lžička z plastu nebo dřeva – ne kov! Sango Pur lze užívat dlouhodobě.

- Dospělí (od 50 kg): Až 3× denně 1 zarovnaná čajová lžička po 3 g
- Děti (10–50 kg): Až 2× denně ½ zarovnané čajové lžičky po 1,5 g
- Batolata (2–10 kg): Až 2× denně ½ zarovnané espresso lžičky po 0,5 g

Podrobné informace

RMS L+ (kapky kyseliny mléčné)

Při akutních potížích užívejte vypočtenou dávku 3–4× denně. Pro podporu střev 1–2× denně nejméně 4–8 týdnů. Dávkování: 1 kapka na 3 kg tělesné hmotnosti, zředěná ve 100–200 ml vody nebo čaje, popíjet. Pozor: kapky neužívejte neředěné!

- Do 15 kg = 5 kapek
- Do 30 kg = 10 kapek
- 50–60 kg = 20 kapek
- 80–90 kg = 30 kapek

Podrobné informace

Zeolith Pur

Užívat ráno a večer před jídlem (30–60 min) nebo večer před spaním. Lžička z plastu nebo dřeva – ne kov! Zeolith Pur lze užívat dlouhodobě.

- Dospělí (od 50 kg): Až 3× denně 1 zarovnaná čajová lžička po 3 g
- Děti (10–50 kg): Až 2× denně ½ zarovnané čajové lžičky po 1,5 g
- Batolata (2–10 kg): Až 2× denně ½ zarovnané espresso lžičky po 0,5 g

Podrobné informace

Silizium Pur

Užívat ráno a večer před jídlem (30–60 min) nebo večer před spaním. Silizium Pur lze užívat dlouhodobě.

- Dospělí (od 50 kg): Až 3× denně 1 zarovnaná odměřená lžička (velká) po 100 mg
- Děti (10–50 kg): Až 2× denně 2 zarovnané odměřené lžičky (malé) po 50 mg
- Batolata (2–10 kg): Až 2× denně ½ zarovnané odměřené lžičky (malá) po 15 mg

Podrobné informace

H2 Pur – molekulární vodík

Lze užívat kdykoli během dne, např. těsně před zvýšenou výkonností nebo koncentrací, nebo na začátku bolesti hlavy či jiných potíží a bolestivých stavů.

• Dospělí (od 50 kg): Až 2× denně rozpustit 1 tabletu ve vodě/tekutině a ihned vypít
• Děti (10–50 kg): Až 1× denně rozpustit 1 tabletu ve vodě/tekutině a ihned vypít
• Batolata (2–10 kg): Až 1× denně rozpustit ½ tablety ve vodě/tekutině a ihned vypít

Podrobné informace

Nature Sense (komplex)

Stříkejte do úst třikrát denně. Nepřekračujte doporučenou denní dávku.

• Dospělí: 3× denně 3–5 stříknutí do úst
• Děti: 3× denně 1–3 stříknutí do úst

Podrobné informace

Berry Vital

Jedna čajová lžička denně (7 ml) stačí k dodání cenných a biologicky dostupných látek. Nalijte Berry Vital na čajovou lžičku (7 ml), vložte lžičku do sklenice neperlivé vody, zamíchejte a vypijte.

Podrobné informace

Obecná doporučení

Pijte dostatek dobré a čisté pitné vody, aby vázané škodliviny mohly být z těla odváděny. Příklady obchodních vod: Lauretana, Plose a Black Forest. Dlouhodobě je výhodnější osmózní filtr jako AQUNA Osmose Light, který vodu také aktivuje a energetizuje.

Podrobné informace

TRIMEDEA

Назад к оглавлению

Краткий обзор:

Применение и дозировка продуктов Trimedea

Коллоидные металлы

Принимать утром и вечером до еды. Между разными коллоидами должно пройти не менее 15–30 минут. Оптимально держать жидкость во рту 1–3 минуты. Используйте пластиковую или деревянную ложку (не металл!) либо мерный стакан (40 мл).

• Взрослые: 2 × в день 1 ст. л. (примерно 15–30 мл каждая)
• Дети: 2 × в день 1–2 ч. л. (примерно 5–15 мл каждая)
• Малыши: 2 × в день от ½ до 1 ч. л. (примерно 3–10 мл каждая)

Наружно можно втирать в сгиб локтя или на запястье (например, у малышей). Поражённые участки также можно слегка распылять. Для внутреннего применения распыляйте в рот дозатором: всасывание через слизистую рта. Домашним животным добавляйте в питьевую воду. При травмах, боли или кожных проблемах распыляйте прямо на область.

Подробная информация

Sango Pur

Принимать утром и вечером до еды (за 30–60 мин) или вечером перед сном. Ложка из пластика или дерева – не металл! Sango Pur можно применять длительно.

• Взрослые (от 50 кг): до 3 × в день 1 ч. л. выровненная 3 г
• Дети (10–50 кг): до 2 × в день ½ ч. л. выровненная 1,5 г
• Малыши (2–10 кг): до 2 × в день ½ эспрессо-ложки выровненная 0,5 г

Подробная информация

RMS L+ (капли молочной кислоты)

При острых симптомах принимать рассчитанную дозу 3–4 раза в день. Для поддержки кишечника 1–2 раза в день не менее 4–8 недель. Дозировка: 1 капля на 3 кг массы тела, разбавить в 100–200 мл воды или чая, пить небольшими глотками. Внимание: не принимать капли неразбавленными!

• До 15 кг = 5 капель
• До 30 кг = 10 капель
• 50–60 кг = 20 капель
• 80–90 кг = 30 капель

Подробная информация

Zeolith Pur

Принимать утром и вечером до еды (за 30–60 мин) или вечером перед сном. Ложка из пластика или дерева – не металл! Zeolith Pur можно применять длительно.

• Взрослые (от 50 кг): до 3 × в день 1 ч. л. выровненная 3 г
• Дети (10–50 кг): до 2 × в день ½ ч. л. выровненная 1,5 г
• Малыши (2–10 кг): до 2 × в день ½ эспрессо-ложки выровненная 0,5 г

Подробная информация

Silizium Pur

Принимать утром и вечером до еды (за 30–60 мин) или вечером перед сном. Silizium Pur можно применять длительно.

• Взрослые (от 50 кг): до 3 × в день 1 мерная ложка (большая), выровненная, 100 мг
• Дети (10–50 кг): до 2 × в день 2 мерные ложки (маленькие), выровненные, по 50 мг
• Малыши (2–10 кг): до 2 × в день ½ мерной ложки (маленькой), выровненная, 15 мг

Подробная информация

H2 Pur – молекулярный водород

Можно принимать в любое время дня, например непосредственно перед повышенной нагрузкой или концентрацией, или в начале головной боли и других неприятных/болезненных состояний.

• Взрослые (от 50 кг): до 2 × в день растворить 1 таблетку в воде/жидкости и сразу выпить
• Дети (10–50 кг): до 1 × в день растворить 1 таблетку в воде/жидкости и сразу выпить
• Малыши (2–10 кг): до 1 × в день растворить ½ таблетки в воде/жидкости и сразу выпить

Подробная информация

Nature Sense (комплекс)

Распылять в полость рта три раза в день. Не превышать рекомендуемую суточную дозу.

• Взрослые: 3 × в день 3–5 нажатий в полость рта
• Дети: 3 × в день 1–3 нажатия в полость рта

Подробная информация

Berry Vital

Одной чайной ложки в день (7 мл) достаточно, чтобы обеспечить организм ценными биодоступными веществами. Налейте Berry Vital на чайную ложку (7 мл), опустите ложку в стакан негазированной воды, размешайте и выпейте.

Подробная информация

Общие рекомендации

Пейте достаточно хорошей чистой питьевой воды, чтобы связанные вещества могли выводиться из организма. Примеры торговых вод: Lauretana, Plose и Black Forest. В долгосрочной перспективе выгоднее осмотический фильтр AQUNA Osmose Light, который также активирует воду.

Подробная информация

TRIMEDEA

العودة الى الفهرس

نظرة سريعة:

الاستخدام والجرعات لمنتجات تريميديا

المعادن الغروانية

مختلفة. من الأفضل إبقاء السائل في الفم من 1 إلى 3 دقائق. استخدم ملعقة بلاستيكية أو خشبية (لا معدن!) أو كأس قياس (40 مل).
يتناول صباحا ومساء قبل الوجبات. يجب أن تفصل 15–30 دقيقة على الأقل بين غروانيات

- البالغون: مرتان يوميا ملعقة كبيرة واحدة (حوالي 15–30 مل لكل مرة)
- الأطفال: مرتان يوميا 1–2 ملعقة صغيرة (حوالي 5–15 مل لكل مرة)
- الصغار: مرتان يوميا من ½ إلى 1 ملعقة صغيرة (حوالي 3–10 مل لكل مرة)

الفم بالبخاخ لامتصاص عبر الغشاء المخاطي. للحيوانات الأليفة: أضف إلى ماء الشرب. عند الإصابة أو الألم أو مشاكل الجلد: رش مباشرة.
في ثنية المرفق أو على المعصم (مثلا للأطفال الصغار). يمكن أيضا رش المناطق المصابة برذاذ خفيف. للاستخدام الداخلي: رش في
للاستخدام الخارجي: فرك الغروانيات

معلومات مفصلة

Sango Pur

ومساء قبل الوجبات (30–60 دقيقة) أو مساء قبل النوم. ملعقة بلاستيكية أو خشبية – لا معدن! يمكن استخدام Sango Pur بشكل مستمر.
يتناول صباحا

- البالغون (من 50 كغ): حتى 3 مرات يوميا ملعقة صغيرة مسطحة بمقدار 3 غ
- الأطفال (10–50 كغ): حتى مرتين يوميا ½ ملعقة صغيرة مسطحة بمقدار 1.5 غ
- الصغار (2–10 كغ): حتى مرتين يوميا ½ ملعقة إسبريسو مسطحة بمقدار 0.5 غ

معلومات مفصلة

RMS L+ (قطرات حمض اللاكتيك)

قطرة واحدة لكل 3 كغ من وزن الجسم، مخففة في 100–200 مل ماء أو شاي، تشرب رشفات. تنبيه: لا تتناول القطرات غير مخففة!
في الأعراض الحادة: تناول الجرعة المحسوبة 3–4 مرات يوميا. لدعم الأمعاء: 1–2 مرة يوميا لمدة 4–8 أسابيع على الأقل. الجرعة:

- حتى 15 كغ = 5 قطرات
- حتى 30 كغ = 10 قطرات
- 50–60 كغ = 20 قطرة
- 80–90 كغ = 30 قطرة

معلومات مفصلة

Zeolith Pur

قبل الوجبات (30–60 دقيقة) أو مساء قبل النوم. ملعقة بلاستيكية أو خشبية – لا معدن! يمكن استخدام Zeolith Pur بشكل مستمر.
يتناول صباحا ومساء

- البالغون (من 50 كغ): حتى 3 مرات يوميا ملعقة صغيرة مسطحة بمقدار 3 غ
- الأطفال (10–50 كغ): حتى مرتين يوميا ½ ملعقة صغيرة مسطحة بمقدار 1.5 غ
- الصغار (2–10 كغ): حتى مرتين يوميا ½ ملعقة إسبريسو مسطحة بمقدار 0.5 غ

معلومات مفصلة

Silizium Pur

يتناول صباحا ومساء قبل الوجبات (30–60 دقيقة) أو مساء قبل النوم. يمكن استخدام Silizium Pur بشكل مستمر.

- البالغون (من 50 كغ): حتى 3 مرات يوميا ملعقة قياس مسطحة (كبيرة) بمقدار 100 ملغ
- الأطفال (10–50 كغ): حتى مرتين يوميا ملعقتا قياس مسطحتان (صغيرتان) بمقدار 50 ملغ لكل منهما
- الصغار (2–10 كغ): حتى مرتين يوميا ½ ملعقة قياس مسطحة (صغيرة) بمقدار 15 ملغ

معلومات مفصلة

الهيدروجين الجزيئي – H2 Pur

يمكن تناوله في أي وقت من اليوم، مثلا مباشرة قبل الحاجة إلى أداء أو تركيز أعلى، أو عند بداية صداع أو شكاوى أخرى وحالات ألم.

• البالغون (من 50 كغ): حتى مرتين يوميا إذابة قرص واحد في ماء/سائل والشرب فورا
• الأطفال (10–50 كغ): حتى مرة واحدة يوميا إذابة قرص واحد في ماء/سائل والشرب فورا
• الصغار (2–10 كغ): حتى مرة واحدة يوميا إذابة ½ قرص في ماء/سائل والشرب فورا

معلومات مفصلة

Nature Sense (مركب)

يرش في الفم ثلاث مرات يوميا. لا تتجاوز الجرعة اليومية الموصى بها.

• البالغون: 3 مرات يوميا 3–5 بخات في الفم
• الأطفال: 3 مرات يوميا 1–3 بخات في الفم

معلومات مفصلة

Berry Vital

الجسم بمكونات قيمة وذات توافر حيوي. اسكب Berry Vital على ملعقة صغيرة (7 مل)، ضع الملعقة في كوب ماء ساكن، حرك واشرب.
ملعقة صغيرة واحدة يوميا (7 مل) تكفي لتزويد

معلومات مفصلة

توصيات عامة

Lauretana وPlose وBlack Forest. على المدى الطويل يكون مرشح التناضح مثل AQUNA Osmose Light أوفر وينشط الماء أيضا.
اشرب كمية كافية من ماء الشرب الجيد والنقي حتى يمكن إخراج المواد المرتبطة من الجسم. أمثلة على مياه تجارية:

معلومات مفصلة

TRIMEDEA

חזרה לתוכן העניינים

סקירה מהירה:

שימוש ומינון של מוצרי טרימדיה

מתכות קולואידיות

15–30 דקות. מומלץ להחזיק את הנוזל בפה 1–3 דקות. השתמשו בכפית פלסטיק או עץ (לא מתכת!) או בכוס מדידה (40 מ"ל).
לקחת בבוקר ובערב לפני הארוחות. בין קולואידים שונים יש להמתין לפחות

- מבוגרים: 2 × ביום 1 כף (כ־15–30 מ"ל בכל פעם)
- ילדים: 2 × ביום 1–2 כפיות (כ־5–15 מ"ל בכל פעם)
- פעוטות: 2 × ביום ½ עד 1 כפית (כ־3–10 מ"ל בכל פעם)

לרסס לפה עם המתקן – ספיגה דרך רירית הפה. לחיות מחמד: להוסיף למי השתייה. בפציעה, כאב או בעיות עור: לרסס ישירות.
לשימוש חיצוני: לשפשף בקפל המרפק או על פרק כף היד (למשל אצל פעוטות). ניתן גם לרסס בעדינות על האזורים. לשימוש פנימי:
מידע מפורט

Sango Pur

לפני הארוחות (30–60 דק') או בערב לפני השינה. כפית מפלסטיק או עץ – לא מתכת! ניתן להשתמש ב־Sango Pur לאורך זמן.
לקחת בבוקר ובערב

- מבוגרים (מ־50 ק"ג): עד 3 × ביום 1 כפית מיושרת של 3 ג'
- ילדים (10–50 ק"ג): עד 2 × ביום ½ כפית מיושרת של 1.5 ג'
- פעוטות (2–10 ק"ג): עד 2 × ביום ½ כפית אספרסו מיושרת של 0.5 ג'

מידע מפורט

(טיפות חומצה לקטית) RMS L+

מינון: טיפה אחת לכל 3 ק"ג משקל גוף, מדוללת ב־100–200 מ"ל מים או תה, ללגימות. זהירות: אין לקחת טיפות לא מדוללות!
בתסמינים חריפים: לקחת את המינון המחושב 3–4 פעמים ביום. לתמיכה במעי: 1–2 פעמים ביום לפחות 4–8 שבועות.

- עד 15 ק"ג = 5 טיפות
- עד 30 ק"ג = 10 טיפות
- 50–60 ק"ג = 20 טיפות
- 80–90 ק"ג = 30 טיפות

מידע מפורט

Zeolith Pur

לפני הארוחות (30–60 דק') או בערב לפני השינה. כפית מפלסטיק או עץ – לא מתכת! ניתן להשתמש ב־Zeolith Pur לאורך זמן.
לקחת בבוקר ובערב

- מבוגרים (מ־50 ק"ג): עד 3 × ביום 1 כפית מיושרת של 3 ג'
- ילדים (10–50 ק"ג): עד 2 × ביום ½ כפית מיושרת של 1.5 ג'
- פעוטות (2–10 ק"ג): עד 2 × ביום ½ כפית אספרסו מיושרת של 0.5 ג'

מידע מפורט

Silizium Pur

לקחת בבוקר ובערב לפני הארוחות (30–60 דק') או בערב לפני השינה. ניתן להשתמש ב־Silizium Pur לאורך זמן.

- מבוגרים (מ־50 ק"ג): עד 3 × ביום 1 כפית מדידה מיושרת (גדולה) של 100 מ"ג
- ילדים (10–50 ק"ג): עד 2 × ביום 2 כפיות מדידה מיושרות (קטנות) של 50 מ"ג כל אחת
- פעוטות (2–10 ק"ג): עד 2 × ביום ½ כפית מדידה מיושרת (קטנה) של 15 מ"ג

מידע מפורט

מימן מולקולרי – H2 Pur

ניתן לקחת בכל שעה ביום, למשל ממש לפני צורך בביצועים או ריכוז מוגברים, או בתחילת כאב ראש או תלונות וכאבים אחרים.

• מבוגרים (מ־50 ק״ג): עד 2 × ביום להמיס טבליה 1 במים/נוזל ולשתות מיד
• ילדים (10–50 ק״ג): עד 1 × ביום להמיס טבליה 1 במים/נוזל ולשתות מיד
• פעוטות (2–10 ק״ג): עד 1 × ביום להמיס ½ טבליה במים/נוזל ולשתות מיד

מידע מפורט

(תרכובת) Nature Sense

לרסס לפה שלוש פעמים ביום. אין לחרוג מהמינון היומי המומלץ.

• מבוגרים: 3 × ביום 3–5 לחיצות לפה
• ילדים: 3 × ביום 1–3 לחיצות לפה

מידע מפורט

Berry Vital

רכיבים יקרי ערך וזמינים ביולוגית. לשפוך Berry Vital על כפית (7 מ״ל), להכניס את הכפית לכוס מים שקטים, לערבב ולשתות.
כפית אחת ביום (7 מ״ל) מספיקה לאספקת

מידע מפורט

המלצות כלליות

Lauretana, ו־Black Forest. לטווח ארוך משתלם יותר מסנן אוסמוזה כמו AQUNA Osmose Light, שמפעיל ומעשיר את המים.
שתו מספיק מי שתייה טובים וטהורים כדי שחומרים קשורים יוכלו לצאת מהגוף. דוגמאות למים מסחריים: Plose

מידע מפורט